

Протокол об итогах государственных закупок способом тендера по закупке Дезинфицирующих средств №5

Способом тендера по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

п.Затобольск

14.03.2018г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1. Утебекова Б.Б. – главный врач, председатель тендерной комиссии
 2. Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член комиссии
 3. Жармухамбетова Е.К. – экономист, член комиссии
- Тарабаева А.З. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии

КГП «Костанайская центральная районная больница» провела закуп способом тендера следующий товар:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, тенге
1	Средство дезинфицирующее должно представлять собой хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство должно содержать в своём составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве должно быть не менее 58%. Средство не должно содержать ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулёза (тестировано на М.Тетрае), возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), внутрибольничных инфекций, легионеллеза; вирусов (включая возбудителей парентеральных гепатитов, вирус полиомиелита, ВИЧ-инфекции, гриппа), грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов и их спор, спор бактерий (возбудителей сибирской язвы и анаэробных инфекций). Средство должно обладать деинвазивной активностью при контаминации цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов (включая аскариды). По параметрам острой токсичности средство должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство должно быть предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок поверхностей, мебели, санитарного, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов ухода за больными, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковров, уборочного инвентаря в организациях здравоохранения; - для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе одноразового использования; - для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; - для дезинфекции жидких выделений, крови, сыровотки, мокроты и других биологических жидкостей; - для дезинфекции пищевых яиц; - для заполнения дезковриков; Для дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок из 1 кг средства должно получаться не менее 3700 литров рабочего раствора. Срок годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 8 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство должно расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую не менее 370 таблеток	банка, 1 кг.	60	5530

Секретарь тендерной комиссии
Тарабаева А.З.

Председатель тендерной комиссии
Утебекова Б.Б.

2	Дезинфекция в ЛПУ и поликлиниках, инвентаря и поверхностей помещений, мебели, сантехоборудования, медицинского инструмента, стоматологических и протезных материалов, замачивание белья, обработка операционных залов, активен в отношении бактерий (в том числе туберкулеза), вирусов (гепатит В, СПИД), грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва). В состав средства входят – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -73% и функциональные компоненты: адипиновая кислота, гидрокарбонат натрия. Масса активного хлора в средстве не менее 42,86% (в пересчете на таблетку 1,5г), 300 таблеток по 3,5гр.	банка, 1 кг.	60	6980
3	Средство в виде таблеток массой 3,4 грамма и гранул со слабым запахом хлора. Действующее вещество – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, также специальные функц.добавки. Содержание активного хлора в среде 44,5+- 4,5%. Обладает: антимикробной активностью в отношении бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов (в т.ч. ВИЧ-инфекция и гепатиты), грибов и плесеней (в т.ч. рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллус). Хорошо растворяемо в воде. Обладает отбеливающим эффектом. Назначение: дезинфекция поверхностей в помещениях, сан.-тех.оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий мед.назначения, мед.отходов, выделений больных и биологических жидкостей. Область применения: ЛПО любого профиля (в т.ч. в отделениях неонатологии). Срок годности средства в нескрываемой упаковке производителя 7 лет, раб.раствор – 9 суток.	банка №90	30	3855
4	Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля должно содержать в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 37,5%, лактулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства должно быть в интервале 6,5-8,5. Средство должно обладать активностью в отношении Гр+ и Гр- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза (М.Тетрае), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовирусов, ротавирусов. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство должно быть предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др. Обработки локтевых сгибов доноров и пациентов. Обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработки кожи инъекционного поля пациентов перед инъекциями, в т.ч. в месте прививки, проведением проколов, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработки перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1 л.	Еврофлакон, 1 литр	50	3800
5	Готовая к применению гелеобразная жидкость с характерным запахом спирта. Действующие вещества: 44% изопропилового спирта, 1% этилового спирта, 0,05% феноксиэтанола, а также функциональные добавки, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей. Обладает бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ) и фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) действием. Обладает пролонгированным эффектом (эффектом в течение 5 часов. Предназначено для гигиенической обработки рук мед.персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи; для обработки рук хирургов; для обработки рук лиц, участвующих в приеме родов в роддомах и отделениях неонатологии; для обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей (в том числе инъекционного поля у новорожденных); для обработки локтевых сгибов доноров; для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов; для обработки перчаток во время оперативных манипуляций, требующих хирургической антисептики. Срок годности 3 года.	Флакон 100 мл.	30	3645
6	Жидкость синего-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид (10,6%). Кроме того, в состав средства входят спирт изопропиловый, карбамид и др. компоненты pH средства 7,6. Средство хорошо смешивается с водой; совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами. Срок годности средства - 5 лет. 1.2. Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; вирусов (гриппа, герпеса, возбудителей гепатита, ОРВИ, ВИЧ – инфекции, рога-, энтеровирусов, полиомиелита. Активен в отношении синегнойной палочки, сальмонеллы, стафилококка и особо –опасных инфекций холеры, чумы, малярии-и др. Обладает моющим эффектом. Срок хранения рабочих растворов 14 суток.	Флакон 1 литр	40	3700

Содерж.

Товар

№

7	Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплекссообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерий легионеллы), и грамположительных бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>, <i>B. subtilis</i>, <i>B. Subtilis</i> и т.п.), микобактерий туберкулеза (<i>M. tuberculosis</i>), вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, паратиф), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, паратиф), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и спорозидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овицидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство должно относиться не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не должно обладать кумулятивным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях.	Еврофлакон 1 литр	40	5500
8	Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать ундециленамидопропилтримоний метосульфат не менее 0,6%, натрий лаурет сульфат 9,2%, кокамидопропилбетаин 4,7%, ПАВ а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (ланолин оксизетилованный, Д-пантенол, Д-лимонен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства должен быть в интервале 3,5-8,5. Средство не должно содержать бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>), а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1-л.	Еврофлакон 1 литр	100	2800
9	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс. кв.м. поверхностей. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -80,5%, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) 1,50гр	Банка 1 кг	60	4500
10	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих	Банка №100	30	3700

	растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5ти рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс.кв.м. поверхностей. Состав: хлорные быстросрастворимые таблетки содержат в качестве действующего вещества не менее 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора (4,5+-5,0)%			
11	Быстрая дезинфекция. Обладает менее токсичным, аллергичным и кожнорезорбтивным действием за счет низкого количества спирта. Пролонгированного действия (гигиеническая, хирургическая обработка рук, обработка операционных и инъекционных полей). Слабый запах этилового спирта. Состав: ЧАС-30% (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), этиловый спирт – 20%, функциональные добавки.	Флакон 1 литр, настольный локтевой дозатор	100	4000
12	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов. Состав: 5-хлор-2(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан)-03%, 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс ПАВ, увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, отдушка и вода рН средства – 5,0-7,0	Флакон 1 литр, настольный локтевой дозатор	100	3600
13	Средство должно представлять собой концентрат, содержащий два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, функциональные добавки. рН средства должен быть в интервале 7,5% - 8,5%. В составе не должны содержаться спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза. Средство должно быть разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. Средство должно применяться ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять для: ПСО ИМН ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10 минут; ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 125 л при экспозиции 2 минут; ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут; ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 250 л при экспозиции 3 минут. Срок годности средства не менее 1,5 года. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л.	Канистра 3,8 литров	5	24614
14	Средство (готовый раствор) должно содержать не менее 0,6% ортофталеревого альдегида в качестве ДВ. рН средства должен быть в интервале 7,4% - 7,6 %. Средство должно обладать вирулицидной, бактерицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции ИМН из различных материалов, в т.ч. термостабильных, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным способом; ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированным способом (автоматическая установка для мойки и ДВУ эндоскопов). Количество циклов в автоматизированной машине для мойки эндоскопов должно быть не менее 75. Время дезинфекции ИМН и ДВУ эндоскопов ручным и автоматизированным способами должна быть не более 5 минут при температуре средства 21+1 С°. Срок годности не менее 2-х лет в нескрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 75 суток. Многократность использования средства не менее 14 дней. Для экспресс-контроля пригодности средства по МЭК при его многократном использовании должны иметься специальные однократные индикаторные полоски. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л.	Канистра 3,8 литров	20	28120
15	Средство (мыло) не должно содержать консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства должно входить ПАВ, кокоат сахарозы, вода особой очистки, рН 6,5% - 7,0%. Средство должно быть предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО. Средство должно быть расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключаям обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 105 мм (Ш) x 109 мм (Г) x 200 мм (В).	штук	120	2600

Handwritten signature and date: 20.05.2024

	Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.	штук	100	3000
16	Дезсредство (кожный антисептик) в виде прозрачного геля в качестве АДВ должно содержать не менее 65% смеси пропиловых спиртов в соотношении 1:0.63, а также смягчающие компоненты и функциональные добавки. Средство не должно содержать красителей и ароматических отдушек. pH средства 6,0% - 6,9%. Средство должно быть предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование средства (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 3-х лет. Средство должно подходить под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 105 мм (Ш) x 109 мм (Г) x 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.			
17	Индикатор воздушной стерилизации, 180/60	упаковка №1000	6	2700
18	Индикатор паровой стерилизации, 132/20	упаковка №1000	3	3700
19	Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также ненонотенные ПАВ, комплексобразователи и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерий легионеллы), и грамположительных бактерий (<i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>B. cereus</i> , <i>B. subtilis</i> и т.п.), микобактерий туберкулеза (<i>M. tuberculosis</i>), гриппа, паратифа (<i>C. albicans</i> , <i>Asp. niger</i>) и полиомиелита, гепатита В и С, ВИЧ, вируса гриппа (в т.ч. «птичий» грипп, паратифа), грибов (<i>C. albicans</i> , <i>Asp. niger</i>) и спороцидной активности, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овицидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство должно относиться не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не должно обладать кумулятивным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинских инструментов, в том числе вращающихся (с хирургическими и стоматологическими инструментами, в том числе вращающихся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности. Срок годности в не вскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не	упаковка №1000 упаковка №1000 Канистра 5 литров	6 3 4	2700 3700 19500

Трун

Малы

менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 5-л.		
--	--	--

Срок годности средств не менее 03.2019г.

24/11/11

Emma

Proof

4

2. Сумма выделенная для закупки 4 246 370 (четыре миллиона двести сорок шесть тысяч триста семьдесят) тенге.

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальны поставщики:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «Тас-Фарм», г.Костанай, пр.Абая, 28/4	030340005660	05.03.2018 год 08 часов 48 минут
2	ТОО «Нурбакс», г.Костанай, ул.Бородин, 196	010940007803	02.03.2018 год 14 часов 22 минуты
3	ТОО «НПО МедиДез», г.Рудный, ул.Топоркова, 39/1	140340019633	05.03.2018 год 08 часов 52 минуты
4	ТОО «БО-НА», г. Павлодар, ул.Гагарина, 36/4	9811240002286	03.03.2018 год 11 часов 07 минуты
5	ТОО «ПК «Аврора», г.Алматы, ул.Спасская, 68а	100940013094	02.03.2018 год 14 часов 22 минуты

4. ТОО «ПК «Аврора», г.Алматы, ул.Спасская, 68а

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	
1	Хлор-Ал	Средство дезинфицирующее представляет собой хлорсодержащие таблетки массой 2,66 г., выделяющие при растворении в воде 1,5 г активного хлора. Средство содержит в своем составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты 99,8%. Содержание активного хлора в средстве 56%. Средство не содержит ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллин-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулезным, в том числе на Mycobacterium leprae, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. По параметрам острой токсичности средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство предназначено: -- профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), - проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого профиля; - дезинфекции изделий медицинского назначения; - дезинфекции медицинских отходов - изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды), отходов, крови (включая сгустки) и других выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности. Для дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок из 1 кг средства должно получаться не менее 3750 литров рабочего раствора. Срок годности средства 5 лет, срок годности рабочих растворов 5 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую 375 таблеток	300
2	Мультихлор	Дезинфекция в ЛПУ и поликлиниках, инвентаря и поверхностей помещения, мебели, сантехоборудования, медицинского инструмента, стоматологических и протезных материалов, замачивание белья, обработка операционных столов, активен в отношении бактерий (в том числе туберкулеза), вирусов (гепатит В, СПИД), грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва). В состав средства входят - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 73 %, 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин - 6 %, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора в средстве 45% (в пересчете на таблетку 1,5г), 300 таблеток по 3,33гр.	1 400
3	Акма-Хлор	Средство в виде таблеток массой 3,33 грамма и гранул со слабым запахом хлора. Действующее вещество -натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) - 80,5%, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Содержание активного хлора в среде 45%. Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов (в т.ч. ВИЧ-инфекция и гепатиты), грибов и плесеней (в т.ч. рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллус). Хорошо растворимо в воде. Обладает отбеливающим эффектом. Назначение: дезинфекция поверхностей в помещениях, сан.-тех.оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий мед.назначения, мед.отходов, выделений больных и биологических жидкостей. Область применения: ЛПУ любого профиля (в т.ч. в отделениях неонатологии). Срок годности средства в нескрываемой упаковке производителя 5 лет, раб.раствор -5 суток.	1 400
4	Санисептин гель	Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля содержит в составе и-пропанол - 55 %, изопропанол - 10%, гексадецилтриметиламмония хлорид - 0,1 %, а также функциональные добавки. Средство обладает активностью в отношении Gr+ и Gr- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерий туберкулеза (M.Tetrae), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовирусов, ротавирусов. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др. Обработки доклевых сгибов доноров и пациентов. Обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработки кожной инъекционной поля пациентов перед инъекциями, в т.ч. в месте прививки, проведением проколов, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработки перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности 5 лет. Еврофлакон объемом 1 л.	2 150
5	Альфапирокс гель	Готовая к применению гелеобразная жидкость с характерным запахом спирта. Действующие вещества: 44% изопропилового спирта, 1% этилового спирта, 0,05% феноксиэтанола, а также функциональные добавки, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей 63 % и-пропанола; 0,2 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Обладает бактерицидным, туберкулезным, вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ) и фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) действием.	670

		Обладает пролонгированным эффектом в течение 3-х часов. Предназначено для гигиенической обработки рук мед. персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи; для обработки рук хирургов; для обработки рук лиц, участвующих в приеме родов в роддомах и отделениях неонатологии; для обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей (в том числе инъекционного поля у новорожденных); для обработки локтевых сгибов доноров; для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов; для обработки перчаток во время оперативных манипуляций, требующих хирургической антисептики. Срок годности 5 лет.	
6	Фенокси-Стерил	Жидкость синего-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) четвертичные аммониевые соединения – 17 %, глутаровый альдегид – 5 %, 2-феноксизанол – 10 %, а также функциональные добавки. Водородный показатель (рН) средства – 2,0 - 4,0. Средство хорошо смешивается с водой; совместимо с мылами, аннионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами. Срок годности средства - 3 года. Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; вирусов (гриппа, герпеса, возбудителей гепатита, ОРВИ, ВИЧ – инфекции, рота-, энтеровирусов, полиомиелита. Активен в отношении синегнойной палочки, сальмонеллы, стафилококка и особо опасных инфекций холеры, чумы, малярии и др. Обладает моющим эффектом. Срок хранения рабочих растворов 14 суток.	
7	Аммодез-4	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе в качестве (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%, N-[4'-[[диметил(додецил) аммоний] метил][1,1'-бифенил]-4-илметил]-N, N-диметил-N-додециламмония дихлорид – 0,1 %, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- 1,0 %, а также функциональные компоненты. Водородный показатель (рН) средства: 5,5-7,5. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метциллин-резистентный стафилококк, ванкомицин- резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулезным, в том числе на Mycobacterium terrae, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным действием. Средство обладает моющими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство «Аммодез-4» по параметрам острой токсичности DL50 при введении в желудок, нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. Средство применяется в медицинских организациях любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии для: назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом – дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука); - предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука); - дезинфекции кувезов; - дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови и других выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности. Срок годности в не вскрытой упаковке производителя должен составлять 3 года, срок годности рабочих растворов 14 дней при условии их хранения в закрытых емкостях.	3 200
8	Акмасепт Ультра	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ содержит 2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан) – 0,25%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. pH 10 % водного раствора мыла - 5,0-8,5. Средство не содержит бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антимикробной активностью в отношении различных Gr- и Gr+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности 3 года. Еврофлакон объемом 1-л	750
9	Акма-Хлор	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 37,5л рабочих растворов, обрабатывается 37,5 тыс. кв.м. поверхностей. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -80,5%, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) 1,50гр	1 400
10	Хлор-Ал	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 37,5л рабочих растворов, обрабатывается 37,5 тыс. кв.м. поверхностей. Состав: хлорные быстрорастворимые таблетки содержат в качестве действующего вещества 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, pH – 5,0-7,0. Средство выпускается в двух формах: таблетки весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора, и гранулы, содержащие 56% активного хлора.	1 300
11	Алмасептин ОП	Быстрая дезинфекция, очищенный этиловый спирт - 70%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид - 0,1%, ЧАС - 0,35% ± 0,2 (кокобензилдиметиламмоний хлорид; алкилбензилдиметиламмония хлорид; дидецилдиметиламмоний хлорид), а также: смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Пролонгированного действия (гигиеническая, хирургическая обработка рук, обработка операционных и инъекционных полей). С запахом этилового спирта.	2 000
12	Акмасепт Ультра	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием 3 часа и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов. Состав: 2,4,4- трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан) – 0,25%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. pH 10 % водного раствора мыла - 5,0-8,5.	750
13	Клин-Энзим	Средство представляет N,N-дидецил-N-метил-поли(оксизтил)аммоний пропионат- 6,3%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид - 0,96%, а также функциональные компоненты – ферментный комплекс (липаза, альфа-амилаза, протеаза). pH средства – 6,0. Средство разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. Средство применяется ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Выход рабочего раствора из 1 л средства составлять для: ПСО ИМН ручным способом не менее 200 л при экспозиции 20 минут; ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 200 л при экспозиции 10 минуты; ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 200 л при экспозиции 20 минут; ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 200 л при экспозиции 10 минуты. Срок годности средства не менее 1,5 года. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л.	24 000
15	Алмасофт	Средство (мыло) не содержит консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства входит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 2,0%, pH 10% водного раствора средства – 5,0 – 7,0. Средство предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой	2 300

		антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО. Средство расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом 1 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата. Срок годности 3 года. Средство не подходит под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 88мм (Ш) x 71,5 мм (Г) x 206 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.	
16	Алмацид – Н	Дезсредство (кожный антисептик) в виде прозрачного геля в качестве АДВ содержит н-пропанол - 53%, дидецилдиметиламмония хлорид - 0,2 %. Средство содержит красителей и ароматических отдушек. Средство для дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования (кроме крытых лаком, а также акрилового стекла и других материалов, подверженных действию спирта), при бактериальных, вирусных и грибковых (каандозы, дерматофитий) инфекциях в медицинских организациях любого профиля, (включая детские отделения и отделения неонатологии), на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения и др.). - для обеззараживания резиновой (в том числе полимерной устойчивой к спирту) обуви, методом протирания или орошения в течение 3-5 минут. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство должно быть упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,75 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование средства. Срок годности средства 5 лет. Средство не подходит под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 122 мм (Ш) x 65 мм (Г) x 265 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке.	1 750
19	Аммодез-4	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе в качестве (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - 9,6%, N-[4'-{диметил(додецил) аммоний} метил][1,1'- бифенил]-4-илметил-N, N-диметил-N-додециламмония дихлорид - 0,1 %, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- 1,0 %, а также функциональные компоненты. Водородный показатель (pH) средства: 5,5-7,5. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллы), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, B. Cereus, B. Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (M. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (C. albicans, Asp. niger) и споридиальной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушает биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство ДЛ50 при введении в желудок, нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. При однократном воздействии средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. При ингаляционном воздействии в виде средства малотоксично, не оказывает сенсибилизирующего эффекта. Не обладает кумулятивным действием. Средство разрешено к применению для: - предварительной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; - дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука); - предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (хирургические, гинекологические, стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами (в т.ч. с использованием ультразвука); - дезинфекции кузевов; - дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови и других выделений больного (мочка, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности. Срок годности в нескрытой упаковке производителя составляет 3 года, срок годности рабочих растворов 14 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство расфасовано в канистру объемом 5-л.	12 800

5. ТОО «Тас-Фарм», г.Костанай, пр.Абая, 28/4

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	Сумма
6	Септаксин	Жидкость синего-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид (10,6%). Кроме того, в состав средства входят спирт изопропиловый, карбамид и др. компоненты pH средства 7,6. Средство хорошо смешивается с водой; совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами. Срок годности средства - 5 лет. 1.2. Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; вирусов (гриппа, герпеса, возбудителей гепатита, ОРВИ, ВИЧ – инфекции, рота-, энтеровирусов, полиомиелита. Активен в отношении синегнойной палочки, сальмонеллы, стафилококка и особо опасных инфекций холеры, чумы, малярии и др. Обладает моющим эффектом. Срок хранения рабочих растворов 14 суток. Срок годности средств не менее 03.2019г	24 600
13	Эмпауэр	Средство представляет собой концентрат, содержащий два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), дистиллированная вода, функциональные добавки. pH средства в интервале 7,5% - 8,5%. В составе не содержатся спирты, альдегиды, перекись водорода, ЧАС, производные фенола, гуанидина, алкиламинов, амилаза, липаза. Средство разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ и стерилизацией. Средство применяется ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Выход рабочего раствора из 1 л средства составляет для: ПСО ИМН ручным способом не менее 500 л при экспозиции 10 минут; ПСО ИМН в ультразвуковых установках не менее 125 л при экспозиции 2 минуты; ПСО гибких эндоскопов ручным способом не менее 250 л при экспозиции 5 минут; ПСО гибких эндоскопов механизированным способом в МДМ не менее 250 л при экспозиции 3 минуты. Срок годности средства не менее 1,5 года. Срок годности средств не менее 03.2019г. Средство расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л.	24 600
14	Клиндезин ОПА плюс	Средство (готовый раствор) содержит не менее 0,6% ортофталевого альдегида в качестве ДВ. pH средства в интервале 7,4% - 7,6 %. Средство обладает вирулицидной, бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и споридиальной	24 600

		активно. Средство разрешено к применению для дезинфекции ИМН из различных материалов, в т.ч. термолабильных, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным способом; ДВУ жестких и гибких эндоскопов ручным, механизированным и автоматизированным способом (автоматическая установка для мойки и ДВУ эндоскопов). Количество циклов в автоматизированной машине для мойки эндоскопов не менее 75. Время дезинфекции ИМН и ДВУ эндоскопов ручным и автоматизированным способами не более 5 минут при температуре средства 21±1 °С. Срок годности не менее 2-х лет в не вскрытой упаковке производителя, во вскрытой канистре не менее 75 суток. Многократное использование средства не менее 14 дней. Для экспресс-контроля пригодности средства по МЭК при его многократном использовании имеются специальные однократные индикаторные полоски. Средство расфасовано в канистру объемом не менее 3,8 л. Срок годности средств не менее 03.2019г.	2 500
15	Мыло «Стеризол» 0,7л.	Средство (мыло) содержит консервантов, щелочей, красителей, ароматических отдушек и абразивных веществ. В состав средства входит ПАВ, кокоат сахарозы, вода особой очистки, pH 6,5% - 7,0%. Средство предназначено для мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком; мытья рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками ЛПО. Средство расфасовано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование препарата (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности не менее 3-х лет. Средство подходит под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 105 мм (Ш) x 109 мм (Г) x 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке. Срок годности средств не менее 03.2019г.	
16	Кожный антисептик Стеризол 0,7л.	Дезерство (кожный антисептик) в виде прозрачного геля в качестве АДВ должно содержать не менее 65% смеси пропиловых спиртов в соотношении 1:0,63, а также смягчающие компоненты и функциональные добавки. Средство не содержит красителей и ароматических отдушек. pH средства 6,0% - 6,9%. Средство предназначено для хирургической, гигиенической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей и локтевых сгибов доноров. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной активностью. Средство упаковано в полимерные, герметичные, стерильные пакеты объемом не более 0,7 л, снабженные обратным дозирующим клапаном, исключающим обратный подсос воздуха, обеспечивающим стерильность средства до конца использования и точное дозирование средства (не более 1,6 мл за одно нажатие). Срок годности средства не менее 3-х лет. Средство подходит под установленные в учреждении настенные дозаторы с локтевым приводом из нержавеющей стали, размером 105 мм (Ш) x 109 мм (Г) x 200 мм (В). Передняя панель дозатора из прозрачного материала для визуального контроля наличия средства в упаковке. Срок годности средств не менее 03.2019г.	

6. ТОО «Нурбакс», г.Костанай, ул.Бородина, 196

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	Сумма
2	Санитайр Р	Дезинфекция в ЛПУ и поликлиниках, инвентаря и поверхностей помещения, мебели, сантехоборудования, мединструмента, стоматологических и протезных материалов, замачивание белья, обработка операционных залов, активен в отношении бактерий (в том числе туберкулеза), вирусов (гепатит В, СПИД), грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва). В состав средства входят – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – 73% и функциональные компоненты: адипиновая кислота, гидрокарбонат натрия. Масса активного хлора в средстве не менее 42,86% (в пересчете на таблетку 1,5г), 300 таблеток по 3,5гр.	6 500
3	Део-хлор	Средство в виде таблеток массой 3,4 грамма и гранул со слабым запахом хлора. Действующее вещество – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, также специальные функц. добавки. Содержание активного хлора в среде 44,5% - 4,5%. Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов (в т.ч. ВИЧ-инфекция и гепатиты), грибов и плесеней (в т.ч. рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллус). Хорошо растворимо в воде. Обладает отбеливающим эффектом. Назначение: дезинфекция поверхностей в помещениях; сан-тех.оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, изделий мед.назначения, мед.отходов, выделений больных и биологических жидкостей. Область применения: ЛПО любого профиля (в т.ч. в отделениях неонатологии). Срок годности средства в нескрываемой упаковке производителя 7 лет, раб.раствор – 9 суток.	
5	Савил гидрогель	Готовая к применению гелеобразная жидкость с характерным запахом спирта. Действующие вещества: 44% изопропилового спирта, 1% этилового спирта, 0,05% феноксиэтанола, а также функциональные добавки, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей. Обладает бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ) и фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) действием. Обладает пролонгированным эффектом в течение 5 часов. Предназначено для гигиенической обработки рук мед.персонала, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи; для обработки рук хирургов; для обработки рук лиц, участвующих в приеме родов в роддомах и отделениях неонатологии; для обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей (в том числе инъекционного поля у новорожденных); для обработки локтевых сгибов доноров; для обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов; для обработки перчаток во время оперативных манипуляций, требующих хирургической антисептики. Срок годности 3 года.	8 500
7	Дезо-триз	Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также немоногенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллеза), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, B. Cereus, B.Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (M. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (C. albicans, Asp. niger) и спорозидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обеспечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство должно относиться не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не должно обладать кумулятивным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках.	6 200

		донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях.	2 600
8	Жидкое мыло Делиа-септ	Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать ундециленамидопропилтримониум метосульфат не менее 0,6%, натрий лаурет сульфат 9,2%, кокаимидопропилбетаин 4,7%, ПАВ а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (ланолин оксизетилованный, Д-пантенол, Д-лимонен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства должен быть в интервале 3,5-8,5. Средство не должно содержать бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1-л.	4 200
9	Экохлор	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс кв.м. поверхностей. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -80,5%, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) 1,50гр	3 200
10	Первохлор	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс кв.м. поверхностей. Состав: хлорные быстрорастворимые таблетки содержат в качестве действующего вещества не менее 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора (4,5+-5,0)%	
19	Дезо-триз	Средство дезинфицирующее (концентрат) должно представлять собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство должно содержать в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства должен быть в интервале 1,2-3,5. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллеза), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, B. Cereus, B.Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (M. terrae), возбудителей ошпозной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (C. albicans, Asp. niger) и спорозидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство должно обладать овицидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно быть хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладать отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство должно относиться не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не должно обладать кумулятивным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в студах донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности. Срок годности в не вскрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство должно быть расфасовано в канистру объемом не менее 5-л.	

7. ТОО «НПО МедиДези», г.Рудный, ул.Топоркова, 39/1

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	Сумма
1	Дезариус хлор	Средство дезинфицирующее представляет собой хлорсодержащие таблетки массой не менее 2,7 г., выделяющие при растворении в воде не менее 1,5 г активного хлора. Средство содержит в своем составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 99,7%. Содержание активного хлора в средстве не менее 58%. Средство не содержит ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии туберкулеза (тестировано на M. Terrae), возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), внутрибольничных инфекций, легионеллеза; вирусов (включая возбудителей парентеральных гепатитов, вирус полиомиелита, ВИЧ-инфекции, гриппа), грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов и их спор, спор бактерий (возбудителей сибирской язвы и анаэробных инфекций). Средство обладает деинвазионной активностью при контаминации цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов (включая острицы). По параметрам острой токсичности средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок поверхностей, мебели, санитарного, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов ухода за больными, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря в организациях здравоохранения; - для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе одноразового использования; - для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; - для дезинфекции жидких выделений, крови, сыроворотки, мокроты и других биологических жидкостей; - для дезинфекции пищевых яиц; - для заполнения дезковриков; Для дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок из 1 кг средства должно получаться не менее 3700 литров рабочего раствора. Срок годности средства не менее 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 8 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство имеет индикаторные полоски. Средство расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую не менее 370 таблеток	5 530
4	Медилакт	Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля содержит в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 37,5%, лактулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства в интервале 6,5-8,5. Средство обладает активностью в отношении Гр+ и Гр- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза (M. Terrae), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовирусов, ротавирусов. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др. Обработки локтевых сгибов доноров и пациентов. Обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработки кожи инъекционного поля пациентов перед инъекциями, в т.ч. в месте прививки, проведением проколов, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработки перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1 л.	

7	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «МедиДез® НЕО»	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неиногенные ПАВ, комплекссообразователь и воду. pH средства в интервале 1,2-3,5. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллы), и грамположительных бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>, <i>B. Cereus</i>, <i>B. Subtilis</i> и т.п.), микобактерий туберкулеза (<i>M. terrae</i>), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и спорозидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство относится не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не обладает кумулятивным действием. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя составляет не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Расфасовано во флакон объемом 1 л.	
8	Средство дезинфицирующее «Жидкое мыло SENSIS» с антисептическим эффектом	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ содержит ундециленамидопропилтримоний метосульфат не менее 0,6%, натрий лаурет сульфат 9,2%, кокамидопропилдетиан 4,7%, ПАВ а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (ланолин оксигидрированный, Д-пантенол, Д-лимонен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства в интервале 3,5-8,5. Средство не содержит бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>), а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 1-л.	
19	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «МедиДез® НЕО»	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид не менее 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 6,5%, молочная кислота не менее 6,5%, изопропиловый спирт не менее 8%, метансульфоновую кислоту не менее 2,0%, бензилоксиметанол, также неиногенные ПАВ, комплекссообразователь и воду. pH средства в интервале 1,2-3,5. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллы), и грамположительных бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>, <i>B. Cereus</i>, <i>B. Subtilis</i> и т.п.), микобактерий туберкулеза (<i>M. terrae</i>), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т. ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и спорозидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство относится не менее чем к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии не менее чем к 4-му классу малоопасных веществ. Не обладает кумулятивным действием. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя составляет не менее 5 лет, срок годности рабочих растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Расфасовано в канистру объемом не менее 5 л.	19 500

8. ООО «БО-НА», г. Павлодар, ул.Гагарина, 36/4

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика	Сумма
1	Дезостерил – ПРЕМИУМ	Средство дезинфицирующее представляет собой хлорсодержащие таблетки массой 2,7 г., выделяющие при растворении в воде 1,5 г активного хлора. Средство содержит в своем составе натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты 99,7%. Содержит активный хлора в средстве 58%. Средство не содержит ангидрида дихлоризоциануровой кислоты, лимонной или адипиновой кислот, карбоната или гидрокарбоната натрия. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерий туберкулеза (тестировано на <i>M. Terrae</i>), возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), внутрибольничных инфекций, легионеллы; вирусов (включая возбудителей парентеральных гепатитов, вирус полиомиелита, ВИЧ-инфекции, гриппа), грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов и их спор, спор бактерий (возбудителей сибирской язвы и анаэробных инфекций). По параметрам острой токсичности средство должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство предназначено: - для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции и проведения генеральных уборок поверхностей, мебели, санитарного белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов ухода за	1 800

		больными, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковров, уборочного инвентаря в организациях здравоохранения; - для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе одноразового использования; - для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; - для дезинфекции жидких выделений, крови, сыроворотки, мокроты и других биологических жидкостей; - для дезинфекции пищевых яиц; - для заполнения дезковриков; Срок годности средства 6 лет, срок годности рабочих растворов не менее 5 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Средство расфасовано в пластиковую банку 1 кг содержащую 375 таблеток	
2	Дезостерил Экстра	Дезинфекция в ЛПУ и поликлиниках, инвентаря и поверхностей помещения, мебели, сантехоборудования, мединструмента, стоматологических и протезных материалов, замачивание белья, обработка операционных залов, активен в отношении бактерий (в том числе туберкулеза), вирусов (гепатит В, СПИД), грибов, особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва). В состав средства входят - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 73% и функциональные компоненты: адипиновая кислота, гидрокарбонат натрия. Масса активного хлора в средстве не менее 42,86% (в пересчете на таблетку 0,75г), 300 таблеток по 3,5г.	3 600
6	Дезостерил-СОФТ	Жидкость сине-голубого цвета. Содержит в качестве действующего вещества ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) - 15%, глиоксаль - 10%, краситель, дистиллированная вода. Средство хорошо смешивается с водой; совместимо с мылами, анионными поверхностно-активными веществами, синтетическими моющими средствами. Срок годности средства - 5 лет. Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; вирусов (гриппа, герпеса, возбудителей гепатита, ОРВИ, ВПЧ - инфекции, рота-, энтеровирусов, полиомиелита. Активен в отношении синегнойной палочки, сальмонеллы, стафилококка и особо опасных инфекций холеры, чумы, малярии и др. Обладает моющим эффектом. Срок хранения рабочих растворов 14 суток.	3 600
7	Дезостерил - ФОРТЕ	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе ЧАС (дицилдиметиламмоний хлорид) - 7,0±0,5%, глиоксаль - 10±0,5%, глутаровый альдегид - 6,0±0,5% и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 2,0±0,2%, а также ПАВ, дистиллированная вода. Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушает биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство относится к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии - к 4-му классу малоопасных веществ. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.	4 000
8	Дезостерил-CLEAN	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе ЧАС (дицилдиметиламмоний хлорид) - 7,0±0,5%, глиоксаль - 10±0,5%, глутаровый альдегид - 6,0±0,5% и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 2,0±0,2%, а также ПАВ, дистиллированная вода. Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушает биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство относится к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии - к 4-му классу малоопасных веществ. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.	2 500
9	Дезостерил-ХЛОР	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс кв.м. поверхностей. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 80,5%, а также адипиновая кислота, карбонат натрия и бикарбонат натрия. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) 1,50г	
10	Дезитабс	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс кв.м. поверхностей. Состав: хлорные быстрорастворимые таблетки содержат в качестве действующего вещества не менее 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора (4,5+-5,0)%	3 690
11	Дезостерил-ЭЛИТ	Таблетки для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, ИМН, белья, посуды, медицинских отходов и др. Удобное приготовление рабочих растворов. С 1 кг. изготавливается 4,5л рабочих растворов, обрабатывается 45 тыс кв.м. поверхностей. Состав: хлорные быстрорастворимые таблетки содержат в качестве действующего вещества не менее 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора (4,5+-5,0)%	3 990
12	Дезостерил-ЭФФЕКТ	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом. Обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов. Состав: 5-хлор-2(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан)-03%, 2-феноксиэтанол, синергетический комплекс ПАВ, увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, отдушка и вода pH средства - 5,0-7,0	3 590
19	Дезостерил - ЧАС	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС) - 9%, дицилдиметиламмония хлорид (ЧАС) - 4%, а также неионогенные поверхностно-активные вещества и отдушка. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионелла), и грамположительных бактерий (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, B. Cereus, B. Subtilis и т.п.), микобактерий туберкулеза (M. terrae), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВПЧ, вирус гриппа и т.д.)	4 000

	«птичий» грипп, парагрипп), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и спороидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов; активно разрушать биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. По степени воздействия на организм средство относится к 3-му классу (вещества умеренно опасные) при введении в желудок. При нанесении на кожу и остром ингаляционном воздействии к 4-му классу малоопасных веществ. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.	
--	---	--

На основании Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:

- ТОО «Тас-Фарм», г.Костанай, пр.Абая, 28/4
- ТОО «Нурбакс», г.Костанай, ул.Бородина, 196
- ТОО «НПО МедиДез», г.Рудный, ул.Топоркова, 39/1
- ТОО «БО-НА», г. Павлодар, ул.Гагарина, 36/4
- ТОО «ПК «Аврора», г.Алматы, ул.Спасская, 68а

В связи с несоответствие технической спецификации отклонить по следующим лотам:

- Лот №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,19 - ТОО «ПК «Аврора», г.Алматы, ул.Спасская, 68а

На основании главы 9 параграфа 4 пункта 85 Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила признать закупу Дезинфицирующих средств:

- Лот № 1, 2, 9, 11, 12 - ТОО «БО-НА»
- Лот № 3, 5, 10 - ТОО «Нурбакс»
- Лот № 4, 7, 8, 19 - ТОО «НПО МедиДез»
- Лот № 6, 13, 14, 15, 16 ТОО «Тас-Фарм»

На основании главы 9 параграфа 4 пункта 84 Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила признать закуп Дезинфицирующих средств не состоявшимся:

- Лот №17 – индикатор воздушной стерилизации, 180/60 – отсутствие представленных тендерных заявок
- Лот №18 - индикатор воздушной стерилизации, 132/20 - отсутствие представленных тендерных заявок

2. Заказчику в срок до 20 марта 2018 года заключить договор о закупе товара.

Председатель комиссии:

Утебекова Б.Б. – главный врач

Члены комиссии

Бажирова К.С. – главный бухгалтер

Жармухамбетова Е.К. – экономист

Секретарь тендерной комиссии

Тарабаева А.З. – специалист по государственным закупкам

